

ФІТОБІОТИКИ ПРОТИ КОКЦИДІОЗУ



**ATH
Company**
NATURAL SOLUTIONS FOR HEALTH

Liptosa ...the green way of life



Сосціліп

КОНТРОЛЬ КОКЦИДІОЗУ ТА НЕКРОТИЧНОГО ЕНТЕРИТУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ФІТОБІОТИКІВ



WWW.ATHCOMPANY.UA
+38 (044) 257-08-59

 ATHCOMPANY.UA

 ATHCOMPANY.UA





Кокцидіоз — це паразитарне захворювання, спричинене найпростішими *Eimeria* spp., яке вражає свійських птахів та інші види тварин. Воно призводить до ентериту та кривавої діареї, що негативно впливає на виробничі показники.

Coccilip L і Coccilip P — фітобіотики (порошковий і рідкий), що дозволяють контролювати кокцидіоз, некротичний ентерит та є альтернативою застосуванню хімічних речовин, таких як ампроліум або порошкові кокцидіостатики.

Дія Coccilip L та Coccilip P базується на синергетичному поєднанні рослинних екстрактів, жирних кислот та ефірних олій, що піддаються спеціальній системі захисту, яка дозволяє поступово вивільняти їхні активні сполуки по всьому травному тракту. **Ефективність Coccilip** базується на потрійному механізмі дії:

- активність проти найпростіших *Eimeria* spp.;
- активність проти *Clostridium perfringens*;
- підсилення цілісності кишечника.

Використання Coccilip забезпечить альтернативу хімічним кокцидіостатикам та іонофорам, або повністю замінивши їх, або як додатковий варіант захисту в програмах ротації, тим самим зменшуючи ризик розвитку резистентності кокцидій.

ПЕРЕВАГИ СОЦІЛІП:

- БЕЗ резистентності;
- БЕЗ залишків і накопичення в організмі;
- БЕЗ періоду каренції;
- Контроль кокцидій та *Clostridium perfringens*;
- Покращення показників продуктивності;
- Сумісність зі звичайними антикоксидійними програмами.






**ДНІВ
ВИВЕДЕННЯ**




**ЗАЛИШКІВ
У М'ЯСІ ТА ЯЙЦЯХ**

ДОЗИ ТА СПОСОБИ ВИКОРИСТАННЯ:

Спосіб використання Coccilip P:

 Птиця	Молода курка і бройлери: 250-500 г/т корму; Несучки та індки: 300-600 г/т корму; Племінні: 350-700 г/т корму.
 Свині	Свиноматки та поросята: 500-1000 г/т корму Вирощування та відгодівля свиней: 250-500 г/т корму.
 Жуйні	Телята та ягнята: 350-500 г/т корму; Інші жуйні: суміш 500-1000 г/т корму.

Спосіб використання Coccilip L:

 Птиця	500-700 мл на 1000 л питної води протягом 7-10 днів.
 Свині і кролі	0,5-1 мл на літр питної води.
 Жуйні	1-1,5 л на 1000 л замінника молока та 300-600 мл на 1000 л питної води для тварин на відгодівлі.